

# CYFLOK 50EW



Producent:  
BAYER CropScience AG  
Landwirtschaftszentrum Monheim  
Alfred Nobel Strasse 50  
D-51368 Leverkusen, Niemcy  
Tel./fax (+49 21) 733 80

Podmiot odpowiedzialny/dystrybutor:  
THEMAR Import Eksport Sp. z o.o.  
Wyczółki 75  
02-820 Warszawa  
tel. 022 4256743  
e-mail: [biuro@themar.com.pl](mailto:biuro@themar.com.pl)  
[www.themar.com.pl](http://www.themar.com.pl)

**CYFLOK 50EW** - Preparat owadobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej. Zawiera 5 % wag. cyflutryny (3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu  $\alpha$ -cyjano-3-fenoksy-4-fluorobenzylu) – związku z grupy pyretroidów o działaniu kontaktowym i pokarmowym. Charakteryzuje się niską toksycznością dla ludzi i zwierząt stałocieplnych. CYFLOK 50EW wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe oraz natychmiastowe działanie insektobójcze. Preparat CYFLOK 50EW długo pozostaje aktywny, nawet po zastosowaniu na powierzchniach bielonych.



**N**

**niebezpieczny dla środowiska**

## Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

## Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny;

S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

## Zastosowanie:

Preparat CYFLOK 50EW przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających takich jak: prusaki, karaluchy, czarne chrząszcze ściółkowe, mrówki faraona, rybiki cukrowe oraz latających jak: komary, muchy, meszki oraz szkodniki magazynowe, np.: wołki, trojszyki, mklik, omacnice, itp. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, fabrycznych i użyteczności publicznej, inwentarskich, magazynach, piekarniach, młynach, itp.

Preparat CYFLOK 50EW działa kontaktowo, efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią. W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów może pojawić się odporność, powinno stosować się rotację preparatów tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych. W przypadku powtórzonego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

Preparatu CYFLOK 50EW nie należy stosować w: szpitalach, izbach chorych oraz w żłobkach i przedszkolach w salach, gdzie przebywają dzieci.

## Sposób stosowania:

**Do zwalczania owadów biegających i latających wewnątrz pomieszczeń** - Należy użyć roztwór roboczy przygotowany przez zmieszanie 80 ml preparatu CYFLOK 50EW z 10 litrami wody. Stosować 50 ml cieczy roboczej na 1m<sup>2</sup> lub opryskiwać do momentu widocznego zwilżenia powierzchni. Opryskiwać miejsca bytowania i wędrówek owadów, a więc dolne fragmenty ścian, okolice listew podłogowych, rur hydraulicznych i c.o., miejsca za szafkami, zlewozmywakami, wannami, ekranami, tylne ścianki mebli oraz szczeliny, szpary, miejsca gdzie owady mogą się ukrywać. Aby zwalczyć owady latające należy opryskać cieczą miejsca częstego siadania owadów: ramy okien, ściany, balkony, itp.

**Do zwalczania owadów latających** - Zmieszać 40-60 ml preparatu CYFLOK 50EW z 10 litrami wody. Stosować 50 ml cieczy roboczej na 1m<sup>2</sup> powierzchni. Należy opryskiwać nasłonecznione powierzchnie ścian, okapy, framugi drzwi i okien i inne powierzchnie, na których chętnie siadają owady.

**Do zwalczania much w pomieszczeniach gospodarskich**  
Przygotować emulsję mieszając 60 ml preparatu CYFLOK 50EW z 10 litrami wody; stosować 50 - 70 ml cieczy roboczej na 1m<sup>2</sup> powierzchni. Na czas wykonywania oprysku należy usunąć zwierzęta z pomieszczenia. Poidła, żłoby i miejsca składowania paszy – starannie przykryć papierem. Opryskiwać miejsca siadania i gromadzenia się owadów: nasłonecznione ściany, framugi okien i drzwi, itp. Stosować powyżej 1,5 m w chlewniach i 2 m w oborach – aby zapobiec kontaktom zwierząt z powierzchnią pokrytą preparatem.

**Aerolowanie przestrzeni (zimna i gorąca mgła).** - Do zwalczania owadów latających i biegających. Przygotować roztwór roboczy mieszając 100 ml preparatu CYFLOK 50EW z 900 ml wody i aplikować w dawce 100 ml cieczy roboczej na 1000 m<sup>3</sup> przestrzeni. Przed stosowaniem wyłączyć wentylację, zamknąć drzwi, okna i uszczelnić inne otwory. Pomieszczenie pozostawić zamknięte przez minimum 60 minut. Aerol rozprowadzić dokładnie i równomiernie tak aby dotarł do wszelkich kryjówek owadów. Aerolowanie powtórzyć według potrzeby.

## Sposób przygotowania cieczy roboczej:

Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy, dodać odpowiednią ilość preparatu CYFLOK 50EW, dopełnić pozostałą ilością wody, starannie wymieszać.

## Środki ostrożności:

Przed przeprowadzeniem oprysku preparatem CYFLOK 50EW należy usunąć z pomieszczenia zwierzęta domowe, ptaki w klatkach, akwaria z rybkami i rośliny ozdobne, żywność i naczynia na żywność. Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność.

- Podczas pracy z preparatem CYFLOK 50EW stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.

- Nie opryskiwać preparatem CYFLOK 50EW łóżeczek ani pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie stykała się nieopakowana żywność.
- Nie opryskiwać urządzeń elektrycznych.
- W przypadku obłania ciała preparatem CYFLOK 50EW, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania preparatem CYFLOK 50EW nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat CYFLOK 50EW przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

**Objawy zatrucia:**

Bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia jelitowo-żółdkowe, osłabienie, podwyższone lub obniżone ciśnienie, podrażnienia i zaczerwienienia skóry i oczu.

**Pierwsza pomoc:**

*W przypadku wdychania:*

(szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach):  
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło i wezwać lekarza.

*W przypadku skażenia oczu:*

W razie potrzeby płukać dużą ilością wody, usunąć szkła kontaktowe, a następnie płukać przy odwiniętych powiekach przez 15 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

*W przypadku skażenia skóry:*

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie posmarować kremem z witaminą E lub zwykłym mleczkiem kosmetycznym.

*W przypadku połknięcia:*

Podać do wypicia, co najmniej 0.5 l wody i jeżeli poszkodowany jest przytomny spowodować wymioty; nie powodować wymiotów w przypadku utraty przytomności ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się preparatu do płuc. Wezwać lekarza.

**Magazynowanie:**

Preparat CYFLOK 50EW przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym magazynie, w temperaturze poniżej 30°C, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych.

**Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:**

1. Resztki niewykorzystanej cieczy użytkowej preparatu CYFLOK 50EW rozcieńczyć wodą i zużyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
2. Zużyte opakowania preparatu CYFLOK 50EW przekazać do uprawnionego odbiorcy.
3. Zabrania się spalania opakowań po środku CYFLOK 50EW we własnym zakresie.

**UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM:**

**BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk	058 349 28 31
Kraków	012 41199 99
Warszawa	022 619 66 54
Poznań	061 847 69 46

**Zalecenia dotyczące wentylacji:**

Preparat CYFLOK 50EW nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Przed użytkowaniem pomieszczenia, w którym wykonano zabieg należy odczekać do czasu wyschnięcia opryskiwanych powierzchni.

Data produkcji:	na opakowaniu
Okres ważności:	3 lata od daty produkcji
Nr serii:	na opakowaniu
Pojemność:	.....