

FICAM 80 WP

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: MZ-**0566/04** z dnia 04.02.2004 r.



SUBSTANCJA CZYNNA

BENDIOKARB – 800 g/kg (80%)
(metylokarbaminianu 2,2-dimetylobenzo-1,3-dioksol-4-ilu) - związek z grupy karbaminianów.

POSTAĆ PRODUKTU

Preparat owadobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.
Preparat działa kontaktowo, efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią.

PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj treść etykiety/instrukcje stosowania.

ZASTOSOWANIE

Ficam 80 WP przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających i latających (much, komarów, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew, pcheł i innych) oraz ptaszyńca kurzego w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

W szpitalach, żłobkach, przedszkolach, itp. wolno stosować preparat jedynie na zapleczu tzn. w pomieszczeniach gospodarczych, warsztatach, pralniach.

T



toksyczny

N



niebezpieczny dla środowiska

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

- S 1/2** Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S 13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S 22 Nie wdychać pyłu.
S 35 Usuwać produkt i jego opakowania w sposób bezpieczny.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe pokaż etykietę.
S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

- R 21** Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R 23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

SPOSÓB UŻYCIA /STOSOWANIA

ZWALCZANIE OWADÓW BIEGAJĄCYCH I LATAJĄCYCH należy użyć roztwór roboczy przygotowany przez zmieszanie 15 g preparatu z 5 litrami wody. W pomieszczeniach o dużej liczebności owadów stosować 30 g preparatu zmieszanego z 5 litrami wody. Do zwalczania much stosować 15 g preparatu rozpuszczonego z 5 litrami wody. Dla zwiększenia atrakcyjności powierzchni opryskiwanych do roztworu można dodać 50 g cukru.

Preparat wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, wymieszać, uzupełnić do potrzebnej objętości wodą i wymieszać ponownie do powstania jednorodnej zawiesiny. Stosować 50 ml zawiesiny na 1 m² lub opryskiwać do momentu widocznego zwilżenia powierzchni.

Przed zabiegiem usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe.

Opryskiwać płynem roboczym miejsca gromadzenia się i drogi przebiegu owadów, listwy, wszelkie szpary i szczeliny, dolne części ścian, dookoła zlewów, rur wodociągowych i centralnego ogrzewania.

Nie opryskiwać powierzchni aparatów i przyrządów używanych do przygotowywania żywności, nie stosować na powierzchniach, na których przechowywana lub spożywana jest żywność lub paszę.

Używać odpowiednich urządzeń do opryskiwania.

Aby zwalczyć owady latające należy opryskać cieczą miejsca częstego siadania owadów: ramy okien, ściany, balkony, itp.

ZWALCZANIE PTASZYŃCA KURZEGO (*Dermanysus gallinae*) **NA FERMACH DROBIU** - PREPARAT FICAM 80WP STOSOWAĆ TYLKO W PUSTYCH POMIESZCZENIACH, BEZ OBECNOŚCI PTAKÓW. MOŻNA STOSOWAĆ W OKRESACH SANITARNYCH PO WYPROWADZENIU STADA Z POMIESZCZENIA.

Preparat stosować w stężeniu 0,3% (15g preparatu FICAM 80WP zmieszać z 5 litrami wody). Dokładnie opryskiwać powierzchnie na których bytuje ptaszyniec. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie szpary, szczeliny, pęknięcia, zakamarki, miejsca w których ptaszyniec chętnie się ukrywa. W przypadku dużego nasilenia szkodnika można zastosować stężenie 0,6% (zmieszać 30g preparatu FICAM 80WP z 5 L wody). Przy zwalczaniu ptaszyńca zużycie cieczy roboczej wynosi 4 litry na 100m² powierzchni.

UWAGA – jednorazowa dezynsekcja nie gwarantuje zwalczenia wszystkich faz rozwojowych szkodnika. Zabieg należy powtórzyć. Pierwszy zabieg zaleca się wykonać w ciągu 2 do 4 dni od usunięcia ptaków z kurnika.

Po upływie przynajmniej 48 godzin od dezynsekcji preparat należy zmyć z powierzchni, z którymi ma kontakt użytkownik. Na pozostałych powierzchniach można go pozostawić.

W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów może pojawić się odporność powinno stosować się rotację preparatów tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych.

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Przed zabiegiem należy usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe. Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność, nie stosować na powierzchniach na których przechowuje się lub spożywa żywność lub paszę.

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- Nie opryskiwać preparatem łóżeczek ani pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie stykała się nie zapakowana żywność.
- Nie opryskiwać urządzeń elektrycznych.
- W przypadku obłania ciała preparatem, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

OBJAWY ZATRUCIA

- bóle i zawroty głowy;
- mdłości i wymioty;
- zaburzenia jelitowo-żołądkowe;
- stan pobudzenia;
- drżenie kończyn;
- obrzęk płuc;
- utrata przytomności;
- drgawki i śpiączka;
- podrażnienia i odczyny alergiczne skóry.

PIERWSZA POMOC

W przypadku wdychania (szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach): Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W przypadku utraty przytomności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza.

W przypadku skażenia oczu:

W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, płukać oczy przy odwiniętych powiekach przez 15 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku skażenia skóry:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie posmarować kremem z witaminą E.

W przypadku połknięcia:

Podać do wypicia co najmniej 0.5 l wody i jeżeli poszkodowany jest przytomny spowodować wymioty. Nie powodować wymiotów w przypadku utraty przytomności ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się preparatu do płuc. Wezwać lekarza.

ANTIDOTUM**BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

**OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE
W POLSCE**

Gdańsk 058 349 28 31
Kraków 012 411 99 99
Warszawa 022 619 66 54
Poznań 061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- w suchym i dobrze wentylowanym magazynie;
- w temperaturze od 0 do 30°C;
- w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci;
- z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.

**POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
PREPARATU I OPAKOWANIEM**

Resztki niewykorzystanej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i zużyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Zużyte opakowania przekazać do uprawnionego odbiorcy.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CEŁÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

**ZALECENIA DOTYCZĄCE
WENTYLACJI**

Preparat działa toksycznie przez drogi oddechowe.

Przed użytkowaniem pomieszczenia, w którym wykonano zabieg należy odczekać do czasu wyschnięcia opryskiwanych powierzchni, a następnie dokładnie wywietrzyć.

PRODUCENT GWARANTUJE ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ SWOICH PRODUKTÓW
SPRZEDAWANYCH WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH.

DATA PRODUKCJI:

OKRES WAŻNOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI

NUMER SERII:

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: